


Главный врач БУЗ ВО ВОКЦ ЦИБС

И.А.Тулдинова

01.10.2020



1. Для проведения профилактики вертикальной передачи инфекции плода и новорожденного:

- Ретровир 10мг/мл-20мл р-л/инф.

- Зидовудин 50мг/5мл-200мл р-л/пр.внутрь

- Вирамун 50мг/5мл-240мл сусп. л/пр.внутрь

- Эпивир 50мг/5мл-240мл р-л/пр.внутрь

2. Для антиретровирусной терапии:

- Олитид 0,6 №30 таб.

- Ламивудин 0,15 №60 таб, Амвигрен 0,3 №30 таб.

- Азимитем 0,3 №60 таб,

- Абакавир 20мг/мл-240мл

- Дизаверокс (0,3+0,15) №60 таб

- Интеленс 0,2 №60 таб

- Ицентресс 0,4 №60 таб

- Калетра (0,2+0,05) №120 таб, Калидавир (100мг+25мг) №60 таб, Калетра (80мг+20мг) 60мл р-л/пр.внутрь

- Невирпин 0,2 №60 таб

- Никавир 0,4 №60 таб

- Кемерувир 0,8 №30 таб, Кемерувир 0,6 №60 таб.

- Атазанавир 0,3 №30 капс

- Ритонавир 0,1 №30 капс

- Реласт 0,6 №30 таб.

- Телзир 0,7 №60 таб

- Тенофовир 0,3 №30 таб

- Эвишпер 200мг+25мг+300мг №30 табл.

- Тивикай 50мг №30 табл.,

- Эпзида 20мг №30 капс.

Зам. главного врача по медицинской части
(по консультированию-поликлинической работе)

Н.В. Душкина